

BILAN :

La contraception d'urgence ne doit être utilisée qu'exceptionnellement et non pas de façon régulière car ses effets sont violents pour l'organisme. En cas de prise trop tardive, ou d'échec, un recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) est possible, en respectant le délai légal de 12 semaines. Son objectif est de provoquer les règles, qui emmèneront avec elles l'embryon fixé dans la muqueuse utérine.

Ces techniques s'appuient sur la connaissance de l'action de la progestérone : à forte dose, elle bloque l'ovulation et bouche le col de l'utérus. Elle stimule également le maintien de la muqueuse utérine. En prenant sa place dans les récepteurs spécifiques des cellules de cette muqueuse, le RU 486 bloque son action et provoque l'apparition des règles.

BILAN :

La contraception d'urgence ne doit être utilisée qu'exceptionnellement et non pas de façon régulière car ses effets sont violents pour l'organisme. En cas de prise trop tardive, ou d'échec, un recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) est possible, en respectant le délai légal de 12 semaines. Son objectif est de provoquer les règles, qui emmèneront avec elles l'embryon fixé dans la muqueuse utérine.

Ces techniques s'appuient sur la connaissance de l'action de la progestérone : à forte dose, elle bloque l'ovulation et bouche le col de l'utérus. Elle stimule également le maintien de la muqueuse utérine. En prenant sa place dans les récepteurs spécifiques des cellules de cette muqueuse, le RU 486 bloque son action et provoque l'apparition des règles.

BILAN :

La contraception d'urgence ne doit être utilisée qu'exceptionnellement et non pas de façon régulière car ses effets sont violents pour l'organisme. En cas de prise trop tardive, ou d'échec, un recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) est possible, en respectant le délai légal de 12 semaines. Son objectif est de provoquer les règles, qui emmèneront avec elles l'embryon fixé dans la muqueuse utérine.

Ces techniques s'appuient sur la connaissance de l'action de la progestérone : à forte dose, elle bloque l'ovulation et bouche le col de l'utérus. Elle stimule également le maintien de la muqueuse utérine. En prenant sa place dans les récepteurs spécifiques des cellules de cette muqueuse, le RU 486 bloque son action et provoque l'apparition des règles.

BILAN :

La contraception d'urgence ne doit être utilisée qu'exceptionnellement et non pas de façon régulière car ses effets sont violents pour l'organisme. En cas de prise trop tardive, ou d'échec, un recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) est possible, en respectant le délai légal de 12 semaines. Son objectif est de provoquer les règles, qui emmèneront avec elles l'embryon fixé dans la muqueuse utérine.

Ces techniques s'appuient sur la connaissance de l'action de la progestérone : à forte dose, elle bloque l'ovulation et bouche le col de l'utérus. Elle stimule également le maintien de la muqueuse utérine. En prenant sa place dans les récepteurs spécifiques des cellules de cette muqueuse, le RU 486 bloque son action et provoque l'apparition des règles.