


Les infections sexuellement transmissibles (IST) constituent une préoccupation de santé publique de plus en plus importante. Le respect des conseils d'hygiène, le dépistage, la vaccination et l'utilisation du préservatif permettent de limiter considérablement la contamination et la propagation des IST.

DOC.

1


Qu'est-ce qu'une IST ?




Mycoplasme (bactérie)




Campagne de prévention :
lutter contre les IST




Virus de l'herpès génital




Virus du Sida



Tréponème (bactérie)
de la **syphilis**



Virus de l'hépatite B



Bactérie de la chlamydie



De nombreuses infections sexuellement transmissibles.

Une infection sexuellement transmissible est une maladie infectieuse susceptible de se transmettre exclusivement ou préférentiellement lors de rapports sexuels (homosexuels ou hétérosexuels). Il existe un grand nombre d'IST, causées par des micro-organismes variés.

DOC.

2

Se protéger des IST

SVT

A

Comment éviter les IST ?

- L'utilisation correcte du préservatif est un moyen simple et efficace d'éviter ou de diminuer considérablement le risque de contamination par des agents infectieux responsables des IST.
- On peut être atteint(e) plusieurs fois de suite par une même infection sexuellement transmissible, surtout si son, sa ou ses partenaires n'ont été ni examinés ni traités.

B

Comment interrompre la chaîne de la transmission ?

- En cas d'infection, prévenir le, la ou les partenaires pour qu'ils se fassent examiner et éventuellement traiter le plus tôt possible.
- Suivre intégralement le traitement prescrit par le médecin (antibiotique en cas d'infection bactérienne).
- En cas de rapports sexuels pendant le traitement, toujours utiliser le préservatif.

DOC.

3

L'importance du préservatif

A

Recrudescence des infections sexuellement transmissibles.

« On les croyait en voie de disparition, elles réapparaissent, plus inquiétantes que jamais. Selon un bilan rendu public hier par l'institut de veille sanitaire (InVS), certaines maladies sexuellement transmissibles sont en augmentation, et les infections à gonocoques (bactéries) ont même explosé de plus de 52 % en 2009. Ce sont en particulier des personnes jeunes de moins de 30 ans qui sont concernées.

Comment expliquer cette recrudescence ? La principale raison semble être l'augmentation de la fréquence des rapports sexuels sans protection, avec une diminution de l'usage du préservatif. L'autre explication pourrait être une résistance des bactéries aux antibiotiques ».

Marc Payet, *Le Parisien*, (20/08/2010).




B

Campagne d'incitation au port du préservatif.

DOC.

4


Dépister et prévenir une IST : « le papillomavirus »



A

Cancer du col de l'utérus et papillomavirus.

En France, le cancer du col de l'utérus est responsable chaque année d'un millier de décès. Cette maladie se développe à partir de lésions dites précancéreuses provoquées par certains virus, dont le papillomavirus.



B

Des vaccins disponibles contre le papillomavirus.

En France, la vaccination se fait à 14 ans ou au plus tard dans l'année suivant le premier rapport sexuel.

Exploitation

- **Expliquer** pourquoi les IST constituent une préoccupation médicale de plus en plus importante et **présenter** les comportements à adopter pour en limiter la propagation (doc. 1 à 4).

AIDE À LA RÉOLUTION

- **Recenser** la diversité des agents infections impliqués et les risques encourus (doc. 1). Un travail de recherche complémentaire peut être nécessaire.
- **Expliquer** l'efficacité des comportements responsables (doc. 1 à 4).